



## Van lieve konijnen tot .....

Het zal iedere bezoeker aan Het Rijk van Nijmegen zijn opgevallen dat er dit jaar meer rabbits in de baan zaten dan ooit. En dan bedoelen we hier het tot de haasachtigen behorende zoogdiertje, het konijn, want konijnen zijn geen knaagdieren, zoals vaak wordt gedacht...

Auteur: Herman Berteler

Schattige diertjes die ons doen denken aan de verhalen van 'Broer Konijn' en zijn bramenstruik. Omdat het schemerdieren zijn, hebben vooral de vroege vogels en de late starters hiervan optimaal kunnen genieten. Levend in groepen van ongeveer twintig volwassen dieren en hun jongen, vormden ze grote kolonies op vooral de Nijmeegse Baan. De voortplanting van het konijn gebeurt het gehele jaar, met de piek tussen februari en augustus. Het aantal konijnen is dan ook het hoogst tussen september en oktober. Een vrouwtje kan per jaar drie tot zeven worpen krijgen, met een minimale tussenperiode van dertig dagen, waarbij na 28 tot 33 dagen drie tot twaalf jongen worden geboren. En de jonge vrouwtjes zijn na vier maanden al geslachtsrijp, dus is het geen wonder dat we veel konijnen hebben.



Biologische schade.





## "Konijnen zijn haasachtigen en geen knaagdieren"

dertig dagen, waarbij na 28 tot 33 dagen drie tot twaalf jongen worden geboren. En de jonge vrouwtjes zijn na vier maanden al geslachtsrijp, dus is het geen wonder dat we veel konijnen hebben.

### Vijanden

Hebben konijnen dan geen vijanden? Jawel, dit zijn de vos, marters en roofvogels, soms een verwilderde kat. Meer bedreigend zijn ziekten als myxomatose en rabbit hemorrhagic disease (RHD), twee virusziekten. Ook tamme konijnen kunnen deze ziekten krijgen. Myxomatose kent tweejaarlijkse pieken in de zomermaanden en wordt verspreid door virusdragers zoals muggen en de konijnenvlo. Door de ziekte kan er een sterfte optreden van wel 50% - 90%. Door de steeds verdere ontwikkeling van tumoren wordt het ziektebeeld steeds ernstiger. Opgezwollen oogkassen, blindheid en zeer trage gang zijn duidelijke kenmerken. In dit stadium is de ziekte ook overdraagbaar van konijn op konijn, zonder de tussenkomst van stekende insecten. Niet alleen zijn ze dan een gemakkelijke prooi voor roofdieren, maar ze zullen al lijdend sterven. En dat levert met zulke grote hoeveelheden leuke, lieve konijntjes, plotseling lugubere en nare beelden op – kadavers op fairway en greens of zieke dieren die worden aangevallen door zwarte kraai en roek – welke we als golfende natuurliefhebbers liever niet zien. De natuur kent echter geen sentiment!



### Bijhouden

Worden de onderkanten van de struiken waarin de konijnen zich schuilhouden tot op zo'n 30 cm bijgehouden, dan is er, gelet op de hoeveelheid dieren, van echte schade nauwelijks sprake. Slechts enkele konijnen wagen zich in de bunker, maar veelal blijft het vreten van grassen beperkt tot de rough langs de bosranden en struiken.



Schattige diertjes die ons doen denken aan de verhalen van 'Broer Konijn' en zijn bramenstruik. Omdat het schemerdieren zijn, hebben vooral de vroege vogels en de late starters hiervan optimaal kunnen genieten. Levend in groepen van ongeveer twintig volwassen dieren en hun jongen, vormden ze grote kolonies op vooral de Nijmeegse Baan. De voortplanting van het konijn gebeurt het gehele jaar, met de piek tussen februari en augustus. Het aantal konijnen is dan ook het hoogst tussen september en oktober. Een vrouwtje kan per jaar drie tot zeven worpen krijgen, met een minimale tussenperiode van